

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cefamadar[®] Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel

Was sind Cefamadar[®] Tabletten und wann werden sie angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Cefamadar[®] Tabletten bei Übergewicht angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Eine krankheitsbedingte Ursache der Fettsucht ist vor Einnahme des Arzneimittels abzuklären.

Eine Langzeitanwendung sollte nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen. Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Cefamadar[®] Tabletten gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann dürfen Cefamadar[®] Tabletten nicht angewendet werden?

Cefamadar[®] Tabletten dürfen bei Kindern unter 14 Jahren nicht ohne ärztliche Verschreibung angewendet werden.

Bei Säuglingen und Kleinkindern sollen Cefamadar[®] Tabletten ebenfalls nicht angewendet werden. Cefamadar[®] Tabletten dürfen bei einer bekannten Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden.

Wann ist bei der Einnahme von Cefamadar[®] Tabletten Vorsicht geboten?

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden, insbesondere gegen die oben genannten Beschwerden.

Dürfen Cefamadar[®] Tabletten während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Cefamadar[®] Tabletten?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben, nehmen Erwachsene 1-3 mal täglich 1 Tablette ein. Kinder zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr maximal 2 Tabletten pro Tag. Cefamadar[®] Tabletten können gekaut oder mit etwas Flüssigkeit (z. B. Wasser) geschluckt werden. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen können Cefamadar[®] Tabletten haben?

Für Cefamadar[®] Tabletten sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Cefamadar[®] Tabletten ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zum auf dem Behälter mit "EXP" bezeichneten Datum verwendet werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Raumtemperatur (15-25° C) aufbewahren.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

Was ist in Cefamadar[®] Tabletten enthalten?

1 Tablette enthält: Calotropis gigantea (Madar) trit. D4 250 mg.

Das Präparat enthält zusätzliche Hilfsstoffe: Lactose, Magnesiumstearat.

Zulassungsnummer: 56113 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Cefamadar[®] Tabletten? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 100 und 200 Tabletten.

Diese Packungsbeilage wurde im August 2002 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Cefamadar[®] comprimés

Médicament homéopathique

Qu'est-ce que le Cefamadar[®] comprimés et quand doit-il être utilisé?

Selon la conception homéopathique des médicaments, Cefamadar[®] comprimés peut être utilisé en cas de surpoids.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas d'obésité, il convient d'en rechercher la cause (pathologie éventuelle) avant de prendre ce médicament. La prise de Cefamadar[®] sur une longue période doit se faire impérativement sous contrôle médical. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez-lui ou à votre pharmacien si Cefamadar[®] comprimés peut être pris simultanément.

Quand Cefamadar[®] comprimés ne doit-il pas être utilisé?

Cefamadar[®] comprimés ne doit pas être utilisé sans ordonnance médicale chez les enfants de moins de 14 ans. Cefamadar[®] comprimés ne doit pas être administré à des nourrissons ou petits enfants. Cefamadar[®] comprimés ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Cefamadar[®] comprimés?

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Cefamadar® comprimés peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Cefamadar® comprimés?

Sauf prescription contraire du médecin, avaler 1 comprimé 1-3 fois par jour (posologie pour adultes). Les enfants de 6 à 14 ans peuvent prendre 2 comprimés par jour au maximum. Les comprimés Cefamadar® sont à mâcher ou à avaler avec un peu d'eau. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets secondaires Cefamadar® comprimés peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Cefamadar® comprimés n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Cefamadar® comprimés et informez-en votre médecin ou pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention "EXP" sur l'emballage.

Conserver ce médicament hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25° C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Cefamadar® comprimés?

1 comprimé contient: Calotropis gigantea (Madar) trit. D4 250 mg.

Cette préparation contient en outre des excipients: lactose, stéarate de magnésium.

Numéro d'autorisation: 56113 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Cefamadar® comprimés? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 100 et 200 comprimés.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2002 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Cefamadar® compresse

Medicamento omeopatico

Che cos'è Cefamadar® compresse e quando si usa?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Cefamadar® compresse si può essere usato in caso di sovrappeso.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Prima di assumere il medicamento bisogna appurare se l'adiposità sia di origine morbosa. Un'assunzione prolungata del medicamento dovrebbe essere fatta solo sotto controllo medico. È opportuno consultare il medico qualora i disturbi persistano.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se può assumere parallelamente Cefamadar® compresse.

Quando non si può usare Cefamadar® compresse?

Cefamadar® compresse non deve essere somministrato senza prescrizione medica ai ragazzi sotto 14 anni. È sconsigliato somministrare Cefamadar® compresse a lattanti e bambini piccoli. Non si deve assumere Cefamadar® compresse in caso di ipersensibilità nota ad uno dei costituenti della formulazione.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Cefamadar® compresse?

Informi il suo medico, il suo farmacista, nel caso in cui:

- soffre di altre malattie

- soffre di allergie o

- assuma o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa), in particolare farmaci per la cura dei disturbi sopra citati.

Si può somministrare Cefamadar® compresse durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo dell'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Come usare Cefamadar® compresse?

Salvo diversa prescrizione medica, la posologia per gli adulti è di 1 compressa 1-3 volte al giorno. Ragazzi da 6 a 14 anni: prendere al massimo 2 compresse al giorno. Le compresse di Cefamadar® si possono masticare o inghiottire con un po' di liquido (p.es. acqua). Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Cefamadar® compresse?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Cefamadar® compresse. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Cefamadar® compresse e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "EXP" sulla confezione.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cefamadar® compresse?

1 compr. contiene: Calotropis gigantea (Madar) trit. D4 250 mg.

Questo preparato contiene inoltre ulteriori eccipienti Lattosio, magnesio stearato.

Numero dell'omologazione: 56113 (Swissmedic)

Dove è ottenibile il Cefamadar® compresse? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, senza prescrizione medica.

Confezioni da 100 e 200 compresse.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2002 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Zulassungsinhaberin - Titulaire de l'autorisation - Titolare dell'omologazione:

steinberg pharma ag · 8400 Winterthur

Herstellerin - Fabricant - Fabbricante:

Cefak KG, D-87437 Kempten